



哈茨木霉菌

TRICHODERMA HARZIANUM

有效成分含量：3亿CFU/克
剂型：可湿性粉剂

农药正式登记证号：PD20140319

微毒

净含量：50克



生产企业名称：美国拜沃股份有限公司

地址：北京市海淀区玉泉路甲12号玉海大厦4102

电话：010-60216031 传真：010-60216031-804

网址：www.chinabioworks.com

杀菌剂

▶ 产品性能（用途）：

本产品为微生物类杀菌剂，能够用来抑制作物的根部病害以及叶部和果实的病害。本品的作用方式复杂，包括化学作用、抗生作用和寄生作用。

使用技术和使用方法：

作物(或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
番茄	灰霉病	100-166.7克/亩	喷雾
番茄	立枯病、猝倒病	4-6克/平方米	灌根
观赏百合（温室）	根腐病	60-70克/升水	浸泡种球
人参	灰霉病	100-140克/亩	喷雾
人参	立枯病	5-6克/平方米	浇灌

(注：(1) 公顷用制剂量=亩用制剂量×15

(2) 总有效成分浓度值（毫克/千克）=（制剂含量×1000000）÷制剂稀释倍数）

1.本品防治人参立枯病在人参播种移栽前开始用药，5-6克/平方米，土壤浇灌处理。2.本品应于人参灰霉病发病初期使用，按每亩100到140克制剂，茎叶喷雾。3.本品应于番茄灰霉病发病初期使用，按每亩100到166.7克制剂，兑水喷雾。4.本品防治番茄立枯病、猝倒病应于番茄苗期发病前使用，按每平方米4到6克用药量（制剂），兑水灌根。5.本品应于观赏百合种植前，按每升水用60到70克制剂，搅拌均匀，浸种球10分钟后播种。

▶ 注意事项：

1. 远离水产养殖区施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具，避免污染水源。
2. 本品小包装开封后，要尽快使用，最好在一次施药中使用完。
3. 在配制药液时，要充分搅拌均匀。
4. 本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。
5. 使用本品时应穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。
6. 使用后的容器应妥善处理，不可做它用，也不可随意丢弃。
7. 避免孕妇和哺乳期妇女接触。

▶ 中毒急救：

使用时如有不适立即停止工作，采用急救措施，携标签送医院就诊；不慎接触皮肤或溅入眼睛用清水冲洗干净；吸入，立即转移到空气新鲜处；误食，立即停止，并用大量的清水漱口，立即携标签就诊。

▶ 贮存和运输：

本品应贮存在阴凉干燥处，远离火源或热源。置于儿童触及不到之处，并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。

质量保证期：2年

生产日期及批号：

原产地：美国

国内办事机构：北京科威拜沃生物技术有限公司



杀 菌 剂