



农药正式登记证号: PD20140319

哈茨木霉菌

TRICHODERMA HARZIANUM

有效成分含量: 3亿CFU/克

剂型: 可湿性粉剂



净含量: 1000克

微毒

生产企业: 美国拜沃股份有限公司

地址: 北京市大兴经济开发区金辅路甲2号凯驰大厦B507

电话: 010-60216031 传真: 010-60216031-804

网址: www.chinabioworks.com

杀菌剂

▶ 产品性能(用途):

本产品为微生物类杀菌剂，能够用来抑制作物的根部病害以及叶部和果实的病害。本品的作用方式复杂，包括化学作用、抗生作用和寄生作用。使用后木霉菌的菌丝感应到寄主（病原菌）分泌的凝集素而趋向寄主生长，凝集素可以结合木霉菌细胞壁上的半乳糖残基，木霉菌通过这个位置侵入寄主，导致病原菌因为细胞膨胀压降低而崩解。通过试验表明，本品对观赏百合根腐病以及番茄的立枯病、猝倒病、灰霉病具有较好的防治效果。

▶ 使用技术和使用方法:

作物(或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
番茄	灰霉病	100-166.7克/亩	喷雾
番茄	猝倒病	4-6克/平方米	灌根
番茄	立枯病	4-6克/平方米	灌根
观赏百合(温室)	根腐病	60-70克/升	浸泡种球

(注: (1) 公顷用制剂量=亩用制剂量×15

(2) 总有效成分量浓度值(毫克/千克) = (制剂含量×1000000) ÷ 制剂稀释倍数)

本品应于番茄灰霉病发病初期使用，按每亩100到166.7克制剂，兑水喷雾。

本品应于番茄苗期发病前使用，按每平方米4到6克用药量(制剂)，兑水灌根。

本品应于观赏百合种植前，按每升水用60到70克制剂，搅拌均匀，浸种球10分钟后播种。

▶ 注意事项:

1. 远离水产养殖区施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具，避免污染水源。
2. 本品小包装开封后，要尽快使用，最好在一次施药中使用完。
3. 在配制药液时，要充分搅拌均匀。
4. 本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。
5. 使用本品时应穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。
6. 使用后的容器应妥善处理，不可做它用，也不可随意丢弃。
7. 避免孕妇和哺乳期妇女接触本品。

▶ 中毒急救:

使用时如有不适，立即停止工作，采用急救措施，携标签送医院就诊；不慎接触皮肤或溅入眼睛应用清水冲洗干净；吸入，立即转移到空气新鲜处；误食，立即停止，并用大量的清水漱口，立即携标签就诊。

▶ 储存和运输:

本品应贮存在阴凉干燥处，远离火源或热源。置于儿童触及不到之处，并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。

质量保证期: 2年

生产日期及批号:

原产地: 美国

国内办事机构: 北京科威拜沃生物技术有限公司



杀 菌 剂