



园林花卉病虫害管理

为保证园林花卉的正常发育、健康生长，有效的发挥园林花卉功能和效益，病虫害防治是花卉生产中不可缺少的环节。20年来，在园林花卉以及其他特色农业方面的病虫害防治，拜沃一直处于领先地位，拜沃一直致力于为广大种植者提供好安全环保的防治产品，园林花卉的病虫害防治程序见下表

园林花卉病虫害		
对象	防治药剂以及使用时期	使用剂量
根部病害	哈茨木霉菌根部型，拌基质或者栽植之后灌根使用；隔三个月再半量补充一次	拌土，741.5g/m ³ 灌根，稀释 3000 倍
叶部病害	适宜发生灰霉病、白粉病的时期，使用哈茨木霉菌叶部型叶面喷施	稀释 300-500 倍，每隔 7-10 天用药一次
	细菌性病害，使用台湾百泰天赞好（枯草芽孢杆菌制剂）	稀释 400-800 倍，每隔 7 天用药一次
	叶部病害发生后，使用哈茨木霉菌叶部型治疗剂量进行叶面喷施	稀释 200-300 倍，每隔 7 天用药一次
虫害	蚜虫、红蜘蛛、白粉虱等害虫，使用 95%矿物油乳油进行叶面喷施	稀释 200-400 倍叶面喷施